

**Zāļu vispārīgie nosaukumi/ medicīnas ierīces, kas paredzēti diagnožu grupas
"11. Muskulu, skeleta un saistaudu slimības" ārstēšanai**

N.p.k.	Diagnozes grupa/ diagnoze	Diagnozes kods (SSK-10)	Komp. apmērs %	Zāļu vispārīgie nosaukumi/ medicīnas ierīces	Kompensācijas nosacījumi	
1	2	3	4	5	6	
11.1 Iekaisīgas poliartrropātijas						
1.	Seropozitīvs reimatoīdais artrīts	M05.0- M05.3 M05.8	75	Diclofenacum Methotrexatum Sulfasalazinum		
	Cita veida reimatoīdais artrīts	M06.0- M06.4 M06.8	75	Hydroxychloroquinum Prednisolonum Triamcinolonum		
				Etanerceptum Infliximabum	Tikai pacientiem ar nepietiekamu atbildes reakciju pret 3 slimību modificējošiem līdzekļiem. Izraksta reimatologs atbilstoši Latvijas Reimatologu asociācijas konsīlija slēdzienam.	
2.	Juvenīlais artrīts	M08.0- M08.4 M08.8 M08.9	100	Diclofenacum Methotrexatum Sulfasalazinum Hydroxychloroquinum Prednisolonum Triamcinolonum Methylprednisolonum		
				Etanerceptum		Bērniem ar poliartrītisko formu, kuriem nav efekta no Methotrexatum lietošanas vai ir pierādīta tā nepanesība. Izraksta Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas pediatri-reimatologi atbilstoši BKUS Bērnu reimatologu konsīlija slēdzienam vai reimatologs, ja turpina terapiju, kas uzsākta līdz 18 gadu vecumam.
11.2 Saistaudu slimības						
3.	Nodozais poliarterīts un radniecīgi stāvokļi	M30.0- M30.3	75	Diclofenacum Azathioprinum Prednisolonum Triamcinolonum		
				Methylprednisolonum		Bērniem līdz 18 g.v.
				Hydroxychloroquinum		
4.	Sistēmiska sarkanā vilkēde	M32.0 M32.1 M32.8	75	Diclofenacum Azathioprinum Methotrexatum Hydroxychloroquinum Prednisolonum Triamcinolonum		
				Methylprednisolonum		Bērniem līdz 18 g.v
5.	Dermatopolimiozīts	M33.0- M33.2	75	Diclofenacum Prednisolonum Triamcinolonum		

1	2	3	4	5	6
				Methylprednisolonum Methotrexatum Hydroxychloroquinum	Bērniem līdz 18g.v.
6.	Sistēmiska sklerodermija	M34.0- M34.2 M34.8	75	Diclofenacum Prednisolonum Triamcinolonum	
				Methylprednisolonum Methotrexatum	Bērniem līdz 18 g.v.
7.	Priekšējās muguras smadzeņu artērijas (a.spinalis anterior) un mugurkaulāja artērijas (a.vertebrales) kompresijas sindromi	M47.0	50	Betahistinum Diclofenacum	
8.	Cita veida spondilozes ar mielopātiju	M47.1	50	Diclofenacum Pentoxifyllinum Pyridostigmini bromidum	
11.3. Kaulu blīvuma un struktūras pārmaiņas					
9.	Osteoporoze ar patoloģisku lūzumu	M80.0- M80.5 M80.8 M80.9	75	Natrii risedronatum Natrii alendronatum Natrii alendronatum/ Colecalciferolum Strontii ranelatum Acidum ibandronicum Calcitriolum	Tikai sievietēm postmenopauzē ar rentgenoloģiski pierādītu muguras skriemeļu, gūžas kaula vai plaukstas pamatnes lūzumu vai lūzumu minimālas traumas rezultātā un ar centrālās densitometrijas rādītājiem (T-skala) terapijas sākumā $\leq -2,5$ SD.
				Alfacalcidolum	Pacientiem ar rentgenoloģiski pierādītu muguras skriemeļu, gūžas kaula vai plaukstas pamatnes lūzumu vai lūzumu minimālas traumas rezultātā un ar centrālās densitometrijas rādītājiem (T- skala) terapijas sākumā $\leq -2,5$ SD.
10.	Medikamentu izraisīta osteoporoze	M81.4	50	Natrii risedronatum Natrii alendronatum Natrii alendronatum/ Colecalciferolum Strontii ranelatum Acidum ibandronicum Calcitriolum	Tikai sievietēm postmenopauzē, kuras vairāk kā 3 mēnešus lieto perorālos glikokortikoīdus, ar centrālās densitometrijas rādītājiem (T-skala) terapijas sākumā $\leq -2,5$ SD.
				Alfacalcidolum	Tikai pacientiem, kuri vairāk kā 3 mēnešus lieto perorālos glikokortikoīdus, ar centrālās densitometrijas rādītājiem: 1. bērniem Z- skala terapijas sākumā ≤ -2 SD, 2. pieaugušajiem T-skala terapijas sākumā $\leq -2,5$ SD.

1	2	3	4	5	6
11.	Idiopātiska osteoporoze	M81.5	50	Alfacalcidolum	Endokrinologa kompetencē. Tikai pacientiem ar pierādītu primāru osteoporozi un ar centrālās densitometrijas rādītājiem: 1) bērniem Z- skala terapijas sākumā ≤ -2 SD 2) pieaugušajiem T- skala terapijas sākumā $\leq -2,5$ SD.
12.	Osteoporoze citur klasificētu slimību dēļ	M82.0 M82.1 M82.8	50	Natrii risedronatum Natrii alendronatum Natrii alendronatum/ Colecalciferolum Strontii ranelatum Acidum ibandronicum Calcitriolum	Tikai sievietēm postmenopauzē ar centrālās densitometrijas rādītājiem (T-skala) terapijas sākumā $\leq -2,5$ SD.
				Alfacalcidolum	Tikai pacientiem ar centrālās densitometrijas rādītājiem: 1) bērniem Z- skala terapijas sākumā ≤ -2 SD, 2) pieaugušajiem T-skala terapijas sākumā $\leq -2,5$ SD.

Zāļu cenu valsts aģentūras direktore

D. Behmane